


6-1-1 上伊那の主な石灰岩地域



白岩岳

戸台(白岩・幕岩)

尾勝谷

地藏岳

丸山谷

風巻峠

巫女淵

6-1-2 石灰岩地域に特徴的な植物の分布（県希少野生植物指定種は掲載しない）

| 種名   | 白岩岳 | 白岩・幕岩 | 尾勝谷 | 地蔵岳 | 丸山谷 | 風巻峠 | 巫女淵 |
|--|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| コマイワヤナギ <i>Salix rupigraga</i>                         | ○   | ○     | ○   | ○   | ○   |     | ○   |
| チチブリンドウ <i>Gentianopsis contorta</i>                   |     | ○     |     |     |     |     |     |
| シライワシヤジン <i>Adenophora nikoensis var. teramotoi</i>    |     | ○     |     |     | ○   |     | ○   |
| キタダケトラノオ <i>Veronica kiusiana var. kitadakemontana</i> |     |       |     |     | ○   |     | ○   |
| カワラウスユキソウ <i>Leontopodium japonicum var. perniveum</i> |     | ○     |     | ○   |     |     | ○   |
| チョウセンナニワズ <i>Daphne pseudomezereum var. koreana</i>    | ○   | ○     |     | ○   |     |     | ○   |
| トダイハハコ <i>Anaphalis sinica var. pernivea</i>           | ○   | ○     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| シライワコゴメグサ <i>Eupharasia maximowiczii var. calcarea</i> |     | ○     |     |     |     |     |     |
| ミヤマムラサキ <i>Eritrichium nipponicum</i>                  | ○   |       |     | ○   |     |     |     |
| ヒメバラモミ <i>Picea maximowiczii</i>                       |     | ○     |     |     | ○   | ○   | ○   |
| トダイアカバナ <i>Epilobium formosanum</i>                    | ○   | ○     |     |     |     |     | ○   |
| チャボゼキショウ <i>Tofieldia coccinea var. gracilis</i>       | ○   | ○     |     | ○   | ○   |     | ○   |

- \* 往路上
- ・クロイチゴ (赤い実で甘い・硬いトゲ)
  - ・モミジイチゴ (オレンジの実)
- 花は、ウツギ, ミツバウツギ (香りがよい)

- \* 湿地内 ○は開花
- カキツバタ; 紫・白。 葉の中肋がはっきりしない。  
何より鮮やかな黄色の編み目 (綾目) がないので, アヤメではない。
  - キショウブ; 黄花 ○ノニガナ (黄花) ・ミゾソバ
  - ・タニタデ ・ミズバショウ ・エゾシロネ ・シデシヤジン
  - ・モウセンゴケ ・ショウジョウバカマ ・ツリフネソウ
  - スゲ→ ○サギスゲ (大阿原よりも良好) ・アゼスゲ
  - ・ホソバオゼヌマスゲ (花火のような実がつく)
  - ・カンスゲ
  - シダ→ ・ヤマドリゼンマイ ・シシガシラ ・ニッコウシダ ・ワラビ
  - ミズゴケ→ ・オオミズゴケ (山地の湿地に普通)



サギスゲ



モウセンゴケ



ノニガナ



ホソバオゼヌマスゲ